

Garcinia Cambogia, Citrus Aurantium, Polinicotinato de Cromo
Tabletas
125 mg / 10.62 mg / 50 mcg

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Cada tableta contiene:

Extracto seco del fruto de Garcinia Cambogia (Kodampuli) al 50 % 250 mg
equivalente a 125 mg de ácido hidroxicítrico.
Extracto seco del fruto de Citrus Aurantium (naranja amarga) al 16 % 177.08 mg
equivalente a 10.6248 mg de sinefrina.
Polinicotinato de cromo al 10 % 0.5 mg
equivalente a 50 mcg de cromo
Excipiente cbp 1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Auxiliar en la reducción y control del peso corporal asociado a dieta y ejercicio en pacientes con sobrepeso y obesidad exógena.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, Hipertiroidismo crónico, durante el embarazo o lactancia, en menores de 12 años.

PRECAUCIONES GENERALES:

Este producto no es un sustituto de las comidas. Debe acompañarse de una dieta equilibrada.

Se recomienda una adecuada valoración al paciente y de sus requerimientos calóricos antes de usarlo.

No se recomienda su administración por más de tres meses consecutivos, ya que puede producir dolor de cabeza, cansancio, agotamiento, palidez y mareo, en cuyo caso el médico debe valorar su retiro. De no presentarse estos síntomas puede descansar un mes y reiniciar el tratamiento.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:

No se cuenta con información clínica de uso durante el embarazo y la lactancia, por lo que no se recomienda su uso en estas etapas.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:

En casos raros se pueden presentar molestias gástricas leves al inicio del tratamiento.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

Las posibles interacciones se relacionan con medicamentos que tengan efecto sobre las concentraciones de glucosa, insulina y lípidos, por lo que se sugiere la valoración médica previa para considerar posibles efectos aditivos de medicamentos antidiabéticos, medicamentos para reducción de peso o medicamentos para el tratamiento de dislipidemias.

PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD:

Garcinia Cambogia: No se tiene información sobre carcinogénesis, teratogénesis y sobre la fertilidad en relación a la combinación de componentes del producto, no obstante, se sugiere no consumirlo durante el embarazo y la lactancia.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral. Se recomienda tomar 1 tableta con las comidas tres veces al día, que, junto con una dieta balanceada, baja en carbohidratos y grasas, ayudará a tener efectos satisfactorios y duraderos. No se recomienda el uso de **Tendiren®** en menores de 12 años.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIS O INGESTA ACCIDENTAL:

Aunque por la naturaleza del producto no son de esperarse efectos graves de sobredosificación o por ingesta accidental, en caso de que suceda se recomienda suspender inmediatamente la administración del producto, de considerarlo conveniente provocar vómito y tomar medidas generales de soporte sintomático.

Tendiren®

Medicamento Herbolario



PRESENTACIÓN:

Caja con 30, 60 ó 120 tabletas.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

No se deje al alcance de los niños.

Literatura exclusiva para médicos.

Reporte las sospechas de reacción adversa al correo:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx y

farmacovigilancia@ifa.com.mx

Hecho en México por:

INVESTIGACIÓN FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V.

Calle 13 Este No. 5, CIVAC, C.P. 62578,

Jiutepec, Morelos, México.

Reg. No. 005P2015 SSA IV

