


Klodex ^{nuevo} Clonazepam

Confianza que
TRANQUILIZA...

Klodex es el **TRATAMIENTO DE ELECCIÓN** en los síntomas de:^{1,2}




- Trastorno de Ansiedad Generalizada.
- Trastorno de Pánico.
- Insomnio.
- Otros trastornos de ansiedad.



ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS ADICCIONES Y EL CLONAZEPAM

1 Indicado para el tratamiento de la abstinencia y desintoxicación del **ALCOHOL**.³

Reducción significativa en la severidad de los síntomas del SAA: 20%.⁴



Prevención de convulsiones y delirio durante la abstinencia.⁴

Adaptado de:
Nogué Xarau S, et al.
Med Integral.
2002;39(6):249-59.

SAA: síndrome de abstinencia alcohólica.

CIWA: escala de evaluación de la abstinencia del instituto clínico para el alcohol, por sus siglas en inglés.

2 Manejo de la crisis de ansiedad y reacciones psicóticas asociadas al **CONSUMO de COCAÍNA**.^{3,5,6}

El consumo de cocaína en México aumentó 7 veces entre 1988 y 2008, en la población urbana.⁷



• Klodex está indicado en **casos de intoxicación aguda por cocaína**.⁸

• El uso de **benzodicepinas** se recomienda en **cuadros de abstinencia**.⁹

3 Tratamiento sustitutivo eficaz y seguro para la **DESINTOXICACIÓN** por benzodicepinas.^{5,10}

Klodex ^{nuevo} Clonazepam

PRESENTACIONES:

2 mg, caja con 30 y 100 tabletas birranuradas.
2.5 mg/mL, caja con frasco gotero con 10 mL.



Referencias:

1. Stahl SM. Clonazepam. In: Stahl's Essential Psychopharmacology Prescriber's Guide. Sixth edition. United Kingdom: Cambridge; 2017. p. 111-115. 2. Jimenez-Genchi A, Guarneros D. Trastorno por Insomnio, en: Jimenez-Genchi A. Guía Clínica para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño. 2ª ed. México: APM Ediciones y Convenciones en Psiquiatría. 2016. p. 47-65. 3. Sáiz-Martínez PA, Jimenez-Treviño L, Díaz-Mesa EM, et al. Patología dual en trastornos de ansiedad: recomendaciones en el tratamiento farmacológico. *Adicciones*. 2014;26(3):254-274. 4. Bonnet U, Lensing M, Specka M, Scherbaum N. Comparison of two oral symptom-triggered pharmacological inpatient treatments of acute alcohol withdrawal: clomethiazole vs. clonazepam. *Alcohol Alcohol*. 2011;46(1):68-73. 5. Pereiro Gómez C. Manual de adicciones para médicos especialistas en formación. Sociedad Española de Estudios sobre el alcohol, el alcoholismo y otras toxicomanías. España. 2009. 778 p. 6. Nogué Xarau S, Picón Cabrera M, Mestre Roca G, Corcuera Romero de la Devesa R. Urgencias en usuarios de cocaína. *Med Integral*. 2002;39(6):249-59. 7. Del Bosque J, Fuentes-Mairena A, Bruno Díaz D, et al. La cocaína: consumo y consecuencias. *Salud Mental*. 2014;37(5):381-389. 8. González Llona I, Tumuluru S, González-Torres MA, Gaviria M. Cocaína: una revisión de la adicción y el tratamiento. *Rev Asoc Esp Neuropsiq*. 2015;35(127):555-571. 9. Galindo Menéndez A. Manejo del paciente con dependencia a la cocaína. *Trastornos Adictivos*. 2000;2(2):122-132. 10. Fluyau D, Revadigar N, Manobianco BE. of the pharmacological management of benzodiazepine withdrawal, dependence, and discontinuation. *Ther Adv Psychopharmacol*. 2018;8(5):147-168.